


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et de produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



ABEMACICLIB VERZENIOS®

À quoi sert ce médicament ?

Verzenios est un médicament anticancéreux qui agit en bloquant certaines protéines, diminuant ainsi la progression du cancer.

Il est utilisé dans le traitement de de certains types de cancers du sein et est administré en association avec des hormonothérapies, telles que des inhibiteurs de l'aromatase ou le fulvestrant.

Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il doit être prescrit par un médecin hospitalier.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il existe trois dosages:

- Verzenios 50 mg : comprimés pelliculés ovales beiges
- Verzenios 100 : mg comprimés pelliculés ovales blancs
- Verzenios 150 : mg comprimés pelliculés jaunes

Posologie Conseils de prise

Acétate d'Abemaciclib VERZENIOS®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



La dose recommandée d'abémaciclib est de **150 mg deux fois par jour** lorsqu'il est administré en association avec une hormonothérapie. Il est recommandé de prendre les comprimés approximativement à la même heure chaque jour, de préférence le matin et le soir. Une adaptation de la posologie pourra être faite si le traitement est mal toléré.



Conserver hors de portée des enfants.



Ne pas prendre de pamplemousse ou de jus de pamplemousse



Contactez rapidement votre médecin et arrêtez de prendre ce médicament en cas de:

- Faiblesse musculaire, contractions musculaires
- Forts battements du cœur (palpitations)

Quelques conseils



Les comprimés sont à avaler entiers (ni brisés, ni mâchés) par voie orale, avec un verre d'eau, lors d'un repas ou non.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Ne pas arrêter le traitement et ne pas modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous vomissez après avoir pris la dose ou si vous oubliez une dose, prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre ou que vous avez vomi.

Si vous avez pris trop de comprimés, ou si une autre personne a pris votre médicament, consultez un médecin ou un hôpital pour savoir comment réagir.



Si vous êtes enceinte, vous ne devez pas utiliser Verzenios.

Si vous êtes en âge de procréer, vous devez utiliser des méthodes de contraception appropriées (par ex. contraception à double barrière telle que le préservatif et le diaphragme) pendant toute la durée du traitement et pendant au moins 3 semaines après la fin du traitement. Vous devez informer votre médecin si vous tombez enceinte.

De même, l'allaitement ne doit pas avoir lieu pendant le traitement.

	Diminution du nombre de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes	Surveillez votre température, faites pratiquer les bilans prescrits par votre médecin. Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires. En cas de saignements importants, contactez le médecin.
	Sécheresse buccale Inflammation de la bouche et des lèvres	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez la bouche En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure, contactez le médecin
	Nausées vomissements Diminution de l'appétit Altération de la perception du goût	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et privilégiez des aliments que vous aimez. . En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. Si besoin, mise en place d'un traitement symptomatique.
	Démangeaisons Sécheresse cutanée	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil
	Fatigue Vertiges Faiblesse musculaire	Repos, exercices légers (marche). En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicule.
	Infections	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. contactez immédiatement votre médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.
Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;