

## Qu'est-ce que ENDOXAN®

Description de la molécule	Description
Cyclophosphamide	Comprimé de 50 mg : blanc, rond 

## Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de ..... mg / jour, soit ..... comprimé(s) de 50 mg par jour, à prendre le matin, ..... (préciser si à prendre en continu ou non)

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A heure fixe. A distance du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

## Posologie - Mode d'administration

une prise par jour, à heure fixe, le matin à jeun	 A jeun								
En continu D'autres schémas d'administration existent. Exemple de J1 à J14, reprise à J28	 J1	 J2	 J3	 J4	 J5	 J6	 J7	...	 J28

## Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Quelles sont les autres informations à connaître ?

### Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et rénale) et clinique (électrocardiogramme).

### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ENDOXAN® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec l'ENDOXAN®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, diarrhée, bouche enflammée (aphtes)</p> <p><b>Anomalie du bilan sanguin</b> : baisse des globules blancs (neutropénie) et anomalies du bilan hépatique</p> <p><b>Stérilité</b> chez l'homme et chez la femme</p> <p><b>Autres</b> : fièvre, infection urinaire, sang dans les urines (par irritation de la vessie), chute des cheveux (alopécie)</p>
<b>QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE ?</b>	
<p>alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble rénal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sang dans les urines</li> <li>&gt; difficultés à uriner ou absence d'urine</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; perte de connaissance, palpitations</li> </ul>
<b>COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES ?</b>	
Hygiène dentaire	<p><b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium.</p> <p><b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool</p>
Infection	<p><b>Évitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera</p>
Poids	<p><b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.</p>
Stérilité	<p><b>Informez-vous</b> sur la conservation du sperme et des gamètes avant l'initiation du traitement.</p>
Chute des cheveux	<p><b>Faites couper</b> vos cheveux. <b>Informez-vous</b> sur les perruques et leur remboursement.</p>
<b>COMMENT ADAPTER VOTRE ALIMENTATION ?</b>	
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés</p>
Diarrhée	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p><b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>
Bouche enflammée (aphtes)	<p><b>Évitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.</p>

