


Qu'est-ce que LYNPARZA®

| Description de la molécule | Description |
|----------------------------|--|
| Olaparib | <p>Gélule de 50 mg : blanche Comprimé de 100 mg : jaune, ovale</p> <p>Les formes GELULES et COMPRIMES ne sont pas INTERCHANGEABLES</p>  |

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de mg / jour, soit gélules de 50 mg , à prendre 2 fois par jour, tous les jours.















A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A heure fixe.

Gélules à prendre à distance des repas (1 heure avant le repas, ou 2 heure après).

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 2 prises par jour, à heure fixe, à distance des repas |  |  |  | | | | | | |
| | < 1h  2h > | < 1h  2h > | < 1h  2h > | | | | | | |
| En continu |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
| | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | | J28 |

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine) et clinique .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre LYNPARZA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis et jus de pamplemousse avec LYNPARZA®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

| LES EFFETS INDÉSIRABLES | |
|--|---|
| Les plus fréquents | <p>Troubles digestifs : nausées, diarrhées, bouche enflammée (aphtes), douleurs abdominales, remontées acides, troubles du goût, perte d'appétit</p> <p>Anomalie du bilan biologique : baisse de l'hémoglobine (anémie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie) et/ou des plaquettes (thrombopénie)</p> <p>Autres : toux, maux de tête, vertiges, fatigue</p> |
| QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE? | |
| Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques | <p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements > Hématomes (bleus), saignements de nez <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête |
| COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES? | |
| Poids | Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs |
| Hygiène dentaire | Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Évitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool |
| Fatigue | Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos. |
| Saignements | Évitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) Informez votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i> |
| Infection | Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera |
| COMMENT ADAPTER SON ALIMENTATION? | |
| Diarrhées | Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante |
| Nausées | Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés |
| Troubles du goût | Favorisez une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour. Évitez les ustensiles de cuisine métallique. |
| Bouche enflammée (aphtes) | Évitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés. |
| Perte de poids | Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir » |
| Remontées acides | Évitez la consommation d'alcool, de tabac, de café et les repas copieux et gras. Privilégiez une alimentation fractionnée |



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>