

## Qu'est-ce que XAGRID®

| Description de la molécule | Description   |
|----------------------------|---|
| Anagrelide                 | Gélule de 0,5 mg blanche<br>Des génériques de différentes formes existent |

## Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de ..... mg/jour soit ..... gélule(s) à prendre ..... fois / jour, tous les jours.

La posologie peut varier tout au long de votre traitement, elle est fonction de votre taux de plaquettes.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans être ouvertes ni dissoutes

A heure fixe, au moment ou en dehors du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

## Posologie - Mode d'administration

|   |  |  |  |  |  |   |  |     |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|-----|---|
| au moins 2 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas |    |  |  |  |  |   |  |     |   |
| En continu  |  J1 |  J2 |  J3 |  J4 |  J5 |  J6 |  J7 | ... |  J28 |

## Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Quelles sont les autres informations à connaître ?

### Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et rénale et votre potassium) et clinique (électro-cardiogramme).

### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre XAGRID® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

*Exemple* : Evitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Passiflore avec le XAGRID®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

| EFFETS INDÉSIRABLES              |  |
|----------------------------------|--|
| Les plus fréquents               | <b>Maux de tête</b><br><b>Troubles de la fonction cardiaque</b> : battements de cœur forts, rapides ou irréguliers (palpitations)<br><b>Troubles généraux</b> : Rétention d'eau<br><b>Troubles digestifs</b> : nausées, diarrhées<br><b>Autres</b> : Éruption cutanée, fatigue, anémie |
| QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE? |  |

Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques

#### **Troubles digestifs**

- > En cas de perte de poids importante et/ou rapide
- > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour
- > Douleur intense dans le ventre

#### **Symptômes évocateurs de troubles cardiaques**

- > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique
- > Gonflement des jambes (œdèmes)
- > Lèvres ou peau bleuâtres

#### **Symptômes évocateurs d'une hémorragie**

- > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements
- > Hématomes (bleus), saignements de nez

